


PROMOT® PLUS

Better germination

Healthier Growth



Higher yields



بروموت بلاس

مخصب مايكروبيولوجي حيوي

المواصفات المصرح عنها.

التركيب

- بروموت بلاس يحتوي على تركيز عال من الفطريات والبكتيريا النافعة لا يقل عن:
Trichoderma spp. 5 × 10⁶ / gram
Aerobic & Anaerobic Bacteria 2 × 10⁹ / gram

إرشادات عامة

- لا تمزج بروموت بلاس مع مبيدات الفطريات والحشرات والنيماتود. ينصح بترك ٤٨ ساعة كحد أدنى بين استخدام بروموت بلاس وهذه المبيدات.
- في حال تعقيم التربة، أترك ٤٨ ساعة كحد أدنى بعد تهوية التربة جيداً قبل استخدام بروموت بلاس.
- في حال استخدام بروموت بلاس كمحلول في الماء: يجب حلّه جيداً في ٢٠ جزء ماء على الأقل. كما يجب تحريك المحلول باستمرار خلال الاستخدام.

نسب وأوقات الاستخدام

- البطاطا: (١) ٥٠٠ غرام لكل ٣ طن تقاوي مباشرة قبل الزراعة بواسطة التعفير أو التغطيس أو رشّ التقاوي بمحلول بروموت بلاس. (٢) ١ كغم للهكتار حقناً في مياه الري ٧-١٠ أيام قبل الزراعة مع المحافظة على رطوبة التربة. (٣) ١ كغم للهكتار بعد الزراعة بحوالي ٥ أسابيع حقناً في مياه الري.
- البيوت المحمية: (١) المزج مع البوتنج سويل بمعدل ١ كغم بروموت بلاس لكل ٢٠ كيس (٨٠٠ لتر). (٢) حقناً في مياه الري: بنسبة ١ كغم بروموت بلاس للهكتار قبل الزرع ٧-١٠ أيام، مع مراعاة الري يومياً حتى تاريخ الزراعة. (٣) تكثّر المعاملة بالمعدل نفسه بعد الزراعة بشهر. (٤) تكثّر المعاملة بعد ذلك بالمعدل نفسه كل ٦ أسابيع حتى نهاية الموسم.

- الخضروات المكشوفة (بطيخ، شمام، خيار، بندورة، الخ...): (١) ١ كغم بروموت بلاس للهكتار قبل الزراعة بـ ٧-١٠ أيام مع مراعاة الري يومياً حتى تاريخ الزراعة. (٢) تكثّر المعاملة بالمعدل نفسه بعد الزراعة بشهر. (٣) تكثّر المعاملة بعد ذلك بالمعدل نفسه كل ٦ أسابيع حتى نهاية الموسم.
- النخيل، الأشجار المثمرة، الحمضيات، العنب، الخ...: (١) ١ كغم بروموت بلاس للهكتار أو آخر الخريف. (٢) ١ كغم للهكتار قبل إزهار الربيع. (٣) تكثّر المعاملة ٢-٤ مرّات خلال الموسم بفاصل ٦-٧ أسابيع بمعدل ٥٠٠ - ١٠٠٠ غرام للهكتار لكل مرّة.
- الشتول والعقل والايصال: تحلّ بودرة بروموت بلاس بنسبة ٥-١٠ غرام لكل لتر ماء وتغسل الشتول والعقل والايصال في المحلول قبل زرعها.
- النباتات المنزلية وأحواض الأزهار: تحلّ بودرة بروموت بلاس بنسبة ١٥-٣٠ غرام في ١٠-٢٠ لتر ماء ويروي بالمحلول.
- تحضير البوتنج سويل: تمزج بودرة بروموت بلاس بنسبة ١ كغم لكل ٥٠٠ كغم بوتنج سويل. ولا يجوز تعقيم البوتنج سويل بعد مزجه مع بروموت بلاس.

الوزن الصافي: (٥٠٠ غرام)
Net Weight: 1/2 Kg

تاريخ الانتاج (Man. Date): March 2010

تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiry Date): March 2013

رقم الدفعة (Lot. No.): 2003301

المستورد: شركة المواد الزراعية المحدودة
ص.ب. 906 رمز بريدي: 112 روي
هاتف: +968-24-485037
فاكس: +968-24-486428

AMC (Oman)

Manufactured by, **JH Biotech, Inc**® Ventura, California, USA

معلومات عامة

- بروموت بلاس مخصب مايكروبيولوجي ناتج عن عملية تخمر مميزة. يحتوي على ميكروبات نافعة وأنظمة أنزيمية معقدة تعمل جميعاً لتحسين نمو النبات. ومن هذه الميكروبات النافعة مجموعات كبيرة من الفطريات والبكتيريا ذات الفوائد التالية:
- إنتاج مواد بيولوجية في التربة منشطة لنمو النبات.
- إنتاج أنزيمات تذيب عنصر الفوسفور في التربة وتيسره للنبات.
- المساهمة الفعالة في عملية تحلل المواد العضوية في التربة.
- تثبيت النيتروجين من الهواء.
- مكافحة وقمع بعض الأمراض الفطرية في التربة وخاصة:
Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii.
- تكبير في نضج المحصول وزيادة اقتصادية في الإنتاج.
- بروموت بلاس لجميع المزروعات: يستخدم في التربة أو حقناً في مياه الري (تنقيط، رشاشات، محوري، الخ.. وخلال جميع مراحل النمو.
- بروموت بلاس غير سام للنبات والحيوان والإنسان، ولا يلوّث البيئة.
- يمكن مزجه مع الأسمدة قبل الاستعمال مباشرة.
- شروط التخزين: يخزّن في أماكن جافة معتدلة الحرارة تحت الـ ٣٠ درجة مئوية ويعدّل عن أشعة الشمس المباشرة. يجب ألا يتعرض في أي وقت لحرارة ٥٠ درجة مئوية وما فوق.
- صلاحية التخزين: ثلاث (٣) سنوات في العبوة الأصلية المغلقة.
- ملاحظة: إن مسؤولية الشركة المنتجة والبائع والموزع محصورة في استبدال أية كمية لا تطابق